

Основні причини патології дитячого мовлення.

- 1. Різна внутрішньоутробна патологія, яка призводить до порушень розвитку плоду. Найбільш грубі дефекти мовлення виникають при порушенні розвитку плоду у період від 4 тижнів до 4 місяців. Цьому сприяє токсикоз при вагітності, вірусні та ендокринні захворювання, травми, несумісність крові за резус-фактором тощо.***
- 2. Родова травма та асфіксія(недостатнє постачання кисню у мозок внаслідок порушення дихання) під час пологів, що призводить до внутрішньочерепних крововиливів.***
- 3. Різні захворювання у перші роки життя дитини. В залежності від часу вилуу і локалізації ураження мозку виникають мовленнєві дефекти різного типу. Особливо впливають на розвиток мови часті інфекційно-вірусні захворювання, мінінго – енцефаліти і ранні шлунково-кишкові розлади.***
- 4. Травми черепа, що супроводжуються струсом мозку.***
- 5. Спадкові фактори. У цих випадках порушення мовлення можуть складати лише частину загального порушення нервової системи і співпадати з інтелектуальною та руховою недостатністю.***
- 6. Несприятливі соціально-побутові умови, які призводять до мікросоціальної педагогічної занедбаності, вегетативної дисфункції, порушень емоційно-вольової сфери та дефіциту у розвитку мовлення.***

Кожна з цих причин, а нерідко і їх поєднання, можуть обумовити порушення різних сторін мовлення.

Велике значення має рання діагностика різних аномалій розвитку мови. Якщо мовленнєві дефекти виявляються лише при вступі дитини до школи або у молодших класах, їх буває важко компенсувати, що негативно впливає на успішність навчання. Якщо ж відхилення виявляються у дитини у ясельному або дошкільному віці, рання медична та педагогічна корекція значно підвищує повноцінне навчання у школі.